

Procédure lors de Gastro-entérite

Selon le protocole du Ministère de la famille

1. Définition de diarrhée

Présence de selles plus liquides non associées à un changement de diète et augmentation de la fréquence des selles.

2. Pour ce qui est des critères d'exclusion, ceux qui suivent ont été retenus



Exclusion
n 24
heures

- L'état général de l'enfant n'est pas bon, il ne peut pas suivre les activités au service de garde
- L'enfant vomit une deuxième fois au service de garde
- L'enfant est aux couches et a une ou plus d'une selle liquide qui **déborde** de la couche;
- L'enfant propre est incapable d'utiliser les toilettes à chacune de ses selles;
- L'enfant dont la diarrhée s'est accompagnée de deux vomissements ou plus au cours des 24 dernières heures (danger de déshydratation);
- L'enfant dont les selles présentent du sang ou du mucus (possibilité de diarrhée d'origine bactérienne qui pourrait nécessiter un traitement spécifique).

En service de garde, on parle de diarrhée épidémique si deux cas ou plus de diarrhée se déclarent dans un même groupe d'enfants à l'intérieur d'une période de 48 heures. Dans un contexte épidémique l'exclusion tombe alors à 48 heures.

Contrairement à ce que suggérait l'édition précédente, l'enfant, en dehors de ces situations, peut demeurer ou revenir au service de garde s'il n'est pas aux couches et s'il est capable d'utiliser les toilettes à chacune de ses selles. Quant à l'enfant aux couches qui se porte mieux, il peut revenir après l'épisode aigu, soit dès que ses selles ne sont plus liquides au point de déborder; **le retour à des selles normales** (semblables à ce qu'elles étaient avant la gastroentérite) **peut prendre plusieurs jours, voire quelques semaines, même si l'infection est maîtrisée.**

3. Renforcer les mesures d'hygiène et de désinfection

-Renforcer le lavage des mains, le nettoyage et la désinfection des surfaces, y compris les jouets.

-Renforcer la technique de changement de couches, prioriser l'utilisation de couches jetables, lingettes à usage unique et le port de gants pour chaque changement de couches.